| 年齢<br>体重<br>Von Harnack表 | | 6ヶ月<br>8kg<br>1／5 | 1歳<br>10kg<br>1／4 | 3歳<br>14kg<br>1／3 | 5歳<br>17kg<br>2／5 | 7歳<br>21kg<br>1／2 | 10歳<br>29kg<br>2／3 | 12歳<br>38kg<br>3／4 | 備考 | 成人<br>1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルダクトン細粒10%<br>(100mg/g) | 1日量 | 15mg<br>0.15g | 30mg<br>0.3g | 35mg<br>0.35g | | 50mg<br>0.5g | | 75mg<br>0.75g | 1日50～100mg 分服(増減)<br>他剤と併用することが多い | |
| ラシックス細粒4%<br>(40mg/g) | 1日1～3mg/kg<br>分1～2 | 8～24mg<br>0.2～0.6g | 10～30mg<br>0.25～0.75g | 14～42mg<br>0.35～1.05g | 17～51mg<br>0.43～1.28g | 21～63mg<br>0.53～1.58g | 29～87mg<br>0.73～2.18g | 38～114mg<br>0.95～2.85g | 1日1回40～80mg<br>連日又は隔日(増減) | |
| チラージンS散0.01%<br>(0.1mg/g) | 1日量 | 5～10μg/kg<br>0.04～0.08mg<br>0.4～0.8g | 5～7μg/kg<br>0.05～0.07mg<br>0.5～0.7g | 0.07～0.098mg<br>0.7～0.98g | | 3～5μg/kg<br>0.063～0.105mg<br>0.63～1.05g | | 2～5μg/kg<br>0.076～0.19mg<br>0.76～1.9g | 開始量:1日0.025～0.1mg<br>維持量:1日0.1～0.4mg | |
| チラージン末 | | | | | | | | | 開始量:1日15～40mg<br>維持量:1日40～200mg | |
| 向 プレドニゾロン散1%<br>(10mg/g) | 1日1～2mg/kg<br>分1～4 | 8～16mg<br>0.8～1.6g | 10～20mg<br>1～2g | 14～28mg<br>1.4～2.8g | 17～34mg<br>1.7～3.4g | 21～42mg<br>2.1～4.2g | 29～58mg<br>2.9～5.8g | 38～76mg<br>3.8～7.6g | 最大:60～80mg | 1日5～60mg<br>分1～4 |
| アンギナール散12.5%<br>(125mg/g) | 1日3～5mg/kg<br>分3 | 24～40mg<br>0.19～0.32g | 30～50mg<br>0.24～0.4g | 42～70mg<br>0.34～0.56g | 51～85mg<br>0.41～0.68g | 63～105mg<br>0.50～0.84g | 87～145mg<br>0.70～1.16g | 114～190mg<br>0.92～1.52g | | |
| | | | 虚血性心疾患・うっ血性心疾患<br>1日75mg 分3 | | | 血栓・塞栓の抑制<br>1日300～400mg 分3～4 | | | ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群<br>1日300mg 分3 | |
| タミフルDS3%<br>※オセルタミビルとして(30mg/g) | 1日4mg/kg<br>1日2回 5日間 | 32mg<br>1.07g | 40mg<br>1.33g | 56mg<br>1.87g | 68mg<br>2.27g | 84mg<br>2.8g | 116mg<br>3.87g | 152mg<br>5.07g | 最大投与量<br>※1回75mg | ※1回75mg<br>1日2回 5日間 |
| トランサミン散50%<br>(500mg/g) | 1日量<br>分3～4 | 200mg<br>0.4g | 300mg<br>0.6g | 400mg<br>0.8g | | 500mg<br>1g | | 750mg<br>1.5 g | | 1日750～200mg<br>分3～4 |
| ノイチーム顆粒10%<br>(100mg/g) | 1日量<br>分3 | 15～30mg<br>0.15～0.3g | | 30～40mg<br>0.3～0.4g | | | 40～60mg<br>0.4～0.6g | | 禁:卵白アレルギー | 1日60～270mg<br>分3 |
| ピリナジン末 | 【解熱】<br>※1回10～15mg/kg<br>1日2回まで<br>投与間隔4～6時間以上 | 80～120mg<br>0.08～0.12g | 100～150mg<br>0.1～0.15g | 140～210mg<br>0.14～0.21g | 170～255mg<br>0.17～0.26g | 210～315mg<br>0.21～0.32g | 290～435mg<br>0.29～0.44g | 380～570mg<br>0.38～0.57g | 最大:1日60mg/kg<br>ただし、<br>成人の量を超えない | ※1回300～500mg<br>1日2回まで |
| | 【鎮痛】<br>※1回10mg/kg<br>8時間毎 | 80mg<br>0.08g | 100mg<br>0.1g | 140mg<br>0.14g | 170mg<br>0.17g | 210mg<br>0.21g | 290mg<br>0.29g | 380mg<br>0.38g | | ※1回0.3～0.5g<br>1日0.9～1.5g |
| 劇 ロートエキス散10%<br>(100mg/g) | 1日量<br>分2～3 | 6mg<br>0.06g | 7mg<br>0.07g | 10mg<br>0.1g | | 15mg<br>0.15g | | 20mg<br>0.2g | 止痢薬、整腸薬<br>鎮吐薬、自律神経薬 | ※1回20～90mg<br>1日2～3回 |
| ワッサーV顆粒 | | | | | | | | | | |

| | 年齢<br>体重<br>Von Harnack表 | | 6ヶ月<br>8kg<br>1／5 | 1歳<br>10kg<br>1／4 | 3歳<br>14kg<br>1／3 | 5歳<br>17kg<br>2／5 | 7歳<br>21kg<br>1／2 | 10歳<br>29kg<br>2／3 | 12歳<br>38kg<br>3／4 | 備考 | 成人<br>1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎮咳薬 | アスペリン散10%<br>(100mg/g) | 1日量<br>分3 | 10mg<br>0.1g | 20mg<br>0.2g | 30mg<br>0.3g | | 40mg<br>0.4g | | 50mg<br>0.5g | | ※1回60～120mg<br>1日 分3 |
| 鎮咳薬 | リン酸コデイン1%<br>(10mg/g) | 1日量<br>分3 | 7mg<br>0.7g | 15mg<br>1.5g | 20mg<br>2g | | 30mg<br>3g | | 45mg<br>4.5g | | ※1回20mg<br>1日60mg 分3 |
| 整腸剤 | 乳酸カルシウム | 1日量<br>1日2～5回 | 0.4g | 0.5g | 0.7g | | 1g | | 1.4g | | ※1回1g<br>1日2～5回 |
| 整腸剤 | ビオスリー<br>※ラクトミンとして(10mg/g) | 1日量<br>分3 | 0.3g | 0.35g | 0.5g | | 0.75g | | 1g | 酪酸菌＋ラクトミン<br>＋糖化菌 | 1日1.5～3g<br>分3(増減) |
| 整腸剤 | ビオフェルミン<br>※ラクトミンとして(6mg/g) | 1日量 | | | | | | | | ラクトミン＋糖化菌 | 1日3g<br>分3(増減) |
| 整腸剤 | ビオフェルミンR<br>※耐性乳酸菌として(6mg/g) | 分3 | 0.6g | 0.75g | 1g | | 1.5g | | 2g | 耐性乳酸菌<br>禁:牛乳アレルギー | |
| 整腸剤 | ラックビーN微粒<br>※ビフィズス菌として(10mg/g) | 1日量 | | | | | | | | ビフィズス菌 | 1日3～6g<br>分3(増減) |
| 整腸剤 | ラックビーR<br>※耐性乳酸菌として(10mg/g) | 分3 | 0.6g | 0.75g | 1g | | 1.5g | | 2g | 耐性乳酸菌 | 1日3g<br>分3(増減) |
| 抗てんかん薬 | 劇 エクセグラン散20%<br>(200mg/g) | 最初1日2～4mg/kg<br>以後1～2週間毎に増量 | 16～32mg<br>0.08～0.16g | 20～40mg<br>0.1～0.2g | 28～56mg<br>0.14～0.28g | 34～68mg<br>0.17～0.34g | 42～84mg<br>0.21～0.42g | 58～116mg<br>0.29～0.58g | 76～152mg<br>0.38～0.76g | 最大:1日12mg/kg<br>最初1日100～200mg 分1～2<br>以後1～2週間毎に増量し<br>通常1日200～400mgまで漸増 | 最大:1日600mg |
| 抗てんかん薬 | エクセグラン散20%<br>(200mg/g) | 通常1日4～8mg/kg<br>分1～3 | 32～64mg<br>0.16～0.32g | 40～80mg<br>0.2～0.4g | 56～112mg<br>0.28～0.56g | 68～136mg<br>0.34～0.68g | 84～168mg<br>0.42～0.84g | 116～232mg<br>0.58～1.16g | 152～304mg<br>0.76～1.52g | | |
| 抗てんかん薬 | エピレオプチマル散50%<br>(500mg/g) | 1日15～40mg/kg<br>分1～3 | 120～320mg<br>0.24～0.64g | 150～400mg<br>0.3～0.8g | 210～560mg<br>0.42～1.12g | 255～680mg<br>0.51～1.36g | 315～840mg<br>0.63～1.68g | 435～1160mg<br>0.87～2.32g | 570～1520mg<br>1.14～3.04g | | 1日450～1000mg<br>分2～3 |
| 抗てんかん薬 | セレニカR細粒40%<br>(400mg/g) | 1日10～30mg/kg | 80～240mg | 100～300mg | 140～420mg | 170～510mg | 210～630mg | 290～870mg | 380～1140mg | | 1日400～1200mg |
| 抗てんかん薬 | デパケン細粒40%<br>(400mg/g) | 分1(徐放剤)～3(食後) | 0.2～0.6g | 0.25～0.75g | 0.35～1.05g | 0.43～1.28g | 0.53～1.58g | 0.73～2.18g | 0.95～2.85g | | 分2～3 |
| 抗てんかん薬 | マイスタン細粒1%<br>(10mg/g) | 開始量:1日0.2mg/kg<br>症状に応じ徐々に増量 | 1.6mg<br>0.16g | 2mg<br>0.2g | 2.8mg<br>0.28g | 3.4mg<br>0.34g | 4.2mg<br>0.42g | 5.8mg<br>0.58g | 7.6mg<br>0.76g | 最大:1日1.0mg/kg<br>開始量:1日10mg 分1～3<br>症状に応じ徐々に増量<br>維持量:1日10～30mg | 最大:1日40mg |
| 抗てんかん薬 | マイスタン細粒1%<br>(10mg/g) | 維持:1日0.2～0.8mg/kg<br>分1～3 | 1.6～6.4mg<br>0.16～0.64g | 2～8mg<br>0.2～0.8g | 2.8～11.2mg<br>0.28～1.12g | 3.4～13.6mg<br>0.34～1.36g | 4.2～16.8mg<br>0.42～1.68g | 5.8～23.2mg<br>0.58～2.32g | 7.6～30.4mg<br>0.76～3.04g | | |

| | 年齢<br>体重<br>Von Harnack表 | | 6ヶ月<br>8kg<br>1／5 | 1歳<br>10kg<br>1／4 | 3歳<br>14kg<br>1／3 | 5歳<br>17kg<br>2／5 | 7歳<br>21kg<br>1／2 | 10歳<br>29kg<br>2／3 | 12歳<br>38kg<br>3／4 | 備考 | 成人<br>1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗生物質 | オラペネム小児用細粒10%<br>(100mg/g) | 1日8mg/kg<br>分2(1日2回) | 64mg<br>0.64g | 80mg<br>0.8g | 112mg<br>1.12g | 136mg<br>1.36g | 168mg<br>1.68g | 232mg<br>2.32g | 304mg<br>3.04g | 1回6mg/kgまで増量可<br>投与期間は7日間 | |
| | クラバモックスDS小児用<br>(642.9mg/1.01g) | 1日96.4mg/kg<br>分2 12時間毎食直前 | 771.2mg<br>1.21g | 964mg<br>1.51g | 1349.6mg<br>2.12g | 1638.8mg<br>2.57g | 2024.4mg<br>3.18g | 2795.6mg<br>4.39g | 3663.2mg<br>5.75g | クラブラン酸K 6.4mg/kg<br>アモキシシリン 90mg/kg | |
| | クラリシッドDS小児用10%<br>(100mg/g) | 1日10～15mg/kg<br>分2～3又は分2～3日 | 80～120mg<br>0.8～1.2g | 100～150mg<br>1～1.5g | 140～210mg<br>1.4～2.1g | 170～255mg<br>1.7～2.55g | 210～315mg<br>2.1～3.15g | 290～435mg<br>2.9～4.35g | 380～570mg<br>3.8～5.7g | レジオネラ肺炎は<br>1日15mg/kgを<br>分2～3日 | 1日400mg |
| | クラリスDS小児用10%<br>(100mg/g) | 1日10～15mg/kg<br>分2～3又は分2～3日 | 80～120mg<br>0.8～1.2g | 100～150mg<br>1～1.5g | 140～210mg<br>1.4～2.1g | 170～255mg<br>1.7～2.55g | 210～315mg<br>2.1～3.15g | 290～435mg<br>2.9～4.35g | 380～570mg<br>3.8～5.7g | | |
| | ケフラール細粒10%<br>(100mg/g) | 1日20～40mg/kg<br>分3 | 160～320mg<br>0.16～3.2g | 200～400mg<br>2～4g | 280～560mg<br>2.8～5.6g | 340～680mg<br>3.4～6.8g | 420～840mg<br>4.2～8.4g | 580～1160mg<br>5.8～1.16g | 760～1520mg<br>7.6～1.52g | | 1日750<br>～1500mg |
| | サワシリン細粒10%<br>(100mg/g) | 1日20～40mg/kg<br>分3～4 | 160～320mg<br>0.16～3.2g | 200～400mg<br>2～4g | 280～560mg<br>2.8～5.6g | 340～680mg<br>3.4～6.8g | 420～840mg<br>4.2～8.4g | 580～1160mg<br>5.8～1.16g | 760～1520mg<br>7.6～1.52g | | ※1回250mg<br>1日3～4回 |
| | ジスロマック細粒小児10%<br>(100mg/g) | 1日10mg/kg<br>1日1回3日間 | 80mg<br>0.8g | 100mg<br>1g | 140mg<br>1.4g | 170mg<br>1.7g | 210mg<br>2.1g | 290mg<br>2.9g | 380mg<br>3.8g | ただし、1日量は<br>成人量を超えない | 治療:600mg<br>1日1回 |
| | セフゾン細粒小児用10%<br>(100mg/g) | 1日9～18mg/kg<br>分3 | 72～144mg<br>0.72～1.44g | 90～180mg<br>0.9～1.8g | 126～252mg<br>1.26～2.52g | 153～306mg<br>1.53～3.06g | 189～378mg<br>1.89～3.78g | 261～522mg<br>2.61～5.22g | 342～684mg<br>3.42～6.84g | | ※1回300mg<br>1日3回 |
| | トミロン細粒小児用10%<br>(100mg/g) | 1日9～18mg/kg<br>分3 | 72～144mg<br>0.72～1.44g | 90～180mg<br>0.9～1.8g | 126～252mg<br>1.26～2.52g | 153～306mg<br>1.53～3.06g | 189～378mg<br>1.89～3.78g | 261～522mg<br>2.61～5.22g | 342～684mg<br>3.42～6.84g | | 1日150<br>～600mg |
| | バクタ顆粒<br>(S:400mg/g、T:80mg/g) | 1日0.1g/kg<br>分2 | 0.8g | 1g | 1.4g | 1.7g | 2.1g | 2.9g | 3.8g | 小児カリニ肺炎 | 1日4g<br>分2 |
| | | 1日0.0125～0.025g/kg<br>分1・就寝前 | 0.1～0.2g | 0.13～0.25g | 0.18～0.35g | 0.21～0.43g | 0.26～0.53g | 0.36～0.73g | 0.48～0.95g | 尿路感染症 | |
| | ファロムDS小児用10%<br>(100mg/g) | 1日15mg/kg<br>分3(1日3回) | 120mg<br>1.2g | 150mg<br>1.5g | 210mg<br>2.1g | 255mg<br>2.55g | 315mg<br>3.15g | 435mg<br>4.35g | 570mg<br>5.7g | 増量の場合<br>※1回10mg/kg上限 | ※1回150～300mg<br>1日3回 |
| | フロモックス小児用細粒<br>(100mg/g) | 1日9mg/kg<br>分3(1日3回) | 72mg<br>0.72g | 90mg<br>0.9g | 126mg<br>1.26g | 153mg<br>1.53g | 189mg<br>1.89g | 261mg<br>2.61g | 342mg<br>3.42g | | ※1回100～150mg<br>1日3回 |
| | メイアクトMS小児用細粒10%<br>(100mg/g) | 1日9mg/kg<br>分3(1日3回) | 72mg<br>0.72g | 90mg<br>0.9g | 126mg<br>1.26g | 153mg<br>1.53g | 189mg<br>1.89g | 261mg<br>2.61g | 342mg<br>3.42g | | ※<br>1回100～200mg<br>1日3回 |
| | 後 セフジトレンピボキシル10%<br>(100mg/g) | 1日9mg/kg<br>分3(1日3回) | 72mg<br>0.72g | 90mg<br>0.9g | 126mg<br>1.26g | 153mg<br>1.53g | 189mg<br>1.89g | 261mg<br>2.61g | 342mg<br>3.42g | | |
| | ユナシン細粒小児用<br>(100mg/g) | 1日15～30mg/kg<br>分3 | 120～240mg<br>1.2～2.4g | 150～300mg<br>1.5～3g | 210～420mg<br>2.1～4.2g | 255～510mg<br>2.55～5.1g | 315～630mg<br>3.15～6.3g | 435～870mg<br>4.35～8.7g | 570～1140mg<br>5.7～11.4g | | ※1回375mg<br>1日2～3回 |

| | 年齢<br>体重<br>Von Harnack表 | | 6ヶ月<br>8kg<br>1／5 | 1歳<br>10kg<br>1／4 | 3歳<br>14kg<br>1／3 | 5歳<br>17kg<br>2／5 | 7歳<br>21kg<br>1／2 | 10歳<br>29kg<br>2／3 | 12歳<br>38kg<br>3／4 | 備考 | 成人<br>1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 去痰薬 | ムコソルバン小児用DS1.5%<br>(15mg/g) | 1日0.9mg/kg<br>分3 | 7.2mg<br>0.48g | 9mg<br>0.6g | 12.6mg<br>0.84g | 15.3mg<br>1.02g | 18.9mg<br>1.26g | 26.1mg<br>1.74g | 34.2mg<br>2.28g | | ※1回15mg<br>1日3回(増減) |
| | ムコダインDS33.3%<br>(333mg/g) | 1日30mg/kg<br>分3 | 240mg<br>0.72g | 300mg<br>0.9g | 420mg<br>1.26g | 510mg<br>1.53g | 630mg<br>1.89g | 870mg<br>2.61g | 1140mg<br>3.42g | | ※1回500mg<br>1日3回(増減) |
| | ムコダイン細粒50%<br>(500mg/g) | 1日30mg/kg<br>分3 | 240mg<br>0.48g | 300mg<br>0.6g | 420mg<br>0.84g | 510mg<br>1.02g | 630mg<br>1.26g | 870mg<br>1.74g | 1140mg<br>2.28g | | |
| 抗アレルギー治療薬 | アレジオンDS1%<br>(10mg/g) | 1日0.25～0.5mg/kg<br>1日1回(増減) | 2～4mg<br>0.2～0.4g | 2.5～5mg<br>0.25～0.5g | 3.5～7mg<br>0.35～0.7g | 4.25～8.5mg<br>0.43～0.85g | 5.25～10.5mg<br>0.53～0.11g | 7.25～14.5mg<br>0.73～0.15g | 9.5～19mg<br>0.95～1.9g | | ※1回10～20mg<br>1日1回(増減) |
| | オノンDS10%<br>(100mg/g) | 1日7mg/kg<br>分2 朝・夕(増減) | 56mg<br>0.56g | 70mg<br>0.7g | 98mg<br>0.98g | 119mg<br>1.19g | 147mg<br>1.47g | 203mg<br>2.03g | 266mg<br>2.66g | 最大投与量:10mg/kg<br>ただし、1日量は<br>成人投与量を<br>超えないこと | 1日450mg |
| | 後 プランルカストDS10%<br>(100mg/g) | 1日7mg/kg<br>分2 朝・夕(増減) | 56mg<br>0.56g | 70mg<br>0.7g | 98mg<br>0.98g | 119mg<br>1.19g | 147mg<br>1.47g | 203mg<br>2.03g | 266mg<br>2.66g | | |
| | サジテンDS0.1%<br>(1mg/g) | 1日0.06mg/kg<br>分2 朝食後・就寝前 | 0.48mg<br>0.48g | 0.6mg<br>0.6g | 0.84mg<br>0.84g | 1.02mg<br>1.02g | 1.26mg<br>1.26g | 1.74mg<br>1.74g | 2.28mg<br>2.28g | | 1日1mg<br>1日2回(増減) |
| | ジルテックDS1.25%<br>(12.5mg/g) | 1日2回 朝・就寝前 | | 2～7歳未満<br>※1回2.5mg | 1日5mg | 1日0.4g | 7～15歳未満<br>※1回5mg | 1日10mg | 1日0.8g | ※1回10mg 1日1回 就寝前(増減)<br>最大投与量:1日20mg | |
| | セルテクトDS2%<br>(20mg/g) | 1日1mg/kg<br>分2 朝・就寝前(増減) | 8mg<br>0.4g | 10mg<br>0.5g | 14mg<br>0.7g | 17mg<br>0.85g | 21mg<br>1.05g | 29mg<br>1.45g | 38mg<br>1.9g | 最大投与量<br>:1日1.5mg/kg | ※1回30mg<br>1日2回(増減) |
| | ニポラジン小児用細粒0.6%<br>(6mg/g) | 1日0.12～0.24mg/kg<br>分2(増減) | 0.96～1.92mg<br>0.16～0.32g | 1.2～2.4mg<br>0.2～0.4g | 1.68～3.36mg<br>0.28～0.56g | 2.04～4.08mg<br>0.34～0.68g | 2.52～5.04mg<br>0.42～0.84g | 3.48～6.96mg<br>0.58～1.16g | 4.56～9.12mg<br>0.76～1.52g | | ※1回3～6mg<br>1日2回(増減) |
| | 劇 ペリアクチン散1%<br>(10mg/g) | 1日量<br>1日1～3回 | 2mg<br>0.2g | 3mg<br>0.3g | 4mg<br>0.4g | | 6mg<br>0.6g | | 8mg<br>0.8g | ※1回4mg<br>1日1～3回(増減) | |
| | ポララミンDS0.2%<br>(2mg/g) | 1日量<br>1日1～4回 | 1mg<br>0.5g | 1.5mg<br>0.75g | 2mg<br>1g | | 3mg<br>1.5g | | 4mg<br>2g | | ※1回2mg<br>1日1～4回 |
| 気管支拡張薬 | | | 6ヶ月～1歳未満<br>6mg/kg | | 1～2歳未満<br>8～10mg/kg | | 2～15歳<br>8～10mg/kg | | | | |
| | 劇 テオドールDS20%<br>(200mg/g) | 1日量 | 48mg<br>0.24g | 60mg<br>0.3g | 112～140mg<br>0.56～0.7g | 136～170mg<br>0.68～0.85g | 168～210mg<br>0.84～1.05g | 232～290mg<br>1.16～1.45g | 304～380mg<br>1.52～1.9g | | ※1回200mg<br>1日2回 |
| | 劇 テオロング顆粒50%<br>(500mg/g) | 分2 朝・就寝前 | 48mg<br>0.01g | 60mg<br>0.12g | 112～140mg<br>0.22～0.28g | 136～170mg<br>0.27～0.34g | 168～210mg<br>0.33～0.42g | 232～290mg<br>0.46～0.58g | 304～380mg<br>0.60～0.76g | | |
| | ホクナリンDS0.1%<br>(1mg/g) | 1日0.04mg/kg<br>分2 | 0.32mg<br>0.32g | 0.4mg<br>0.4g | 0.56mg<br>0.56g | 0.68mg<br>0.68g | 0.84mg<br>0.84g | 1.16mg<br>1.16g | 1.52mg<br>1.52g | | ※1回1mg<br>1日2回(増減) |
| | メプチン顆粒0.01%<br>(0.1mg/g) | ※1回0.00125mg/kg<br>6歳未満<br>※1回0.025mg<br>6歳以上 | 0.01mg<br>0.1g | 0.0125mg<br>0.125g | 0.0175mg<br>0.175g | 0.02125mg<br>0.2125g | 1日2回 朝・就寝前<br>又は 1日3回 朝・昼・就寝前 | | | ※1回0.05mg<br>1日1回 就寝前<br>1日1回 朝・就寝前(増減) | |
| | | | 1日1回 就寝前<br>又は 1日2回 朝・就寝前 | | | | 0.025mg<br>0.25g | | | | |

# シロップ剤

| 薬剤名 | 含有量 | 1日量（10kg） | 1回量 | 服用回数 |
|---|---|---|---|---|
| ジョサマイシロップ3% | 1mg/ml | 10ml/10kg | | 3-4回 |
| カナマイシンシロップ5% | 50mg/ml | 10～20ml/10kg | | 4回 |
| ピクロックスシロップ8% | 80mg/ml | | 1回2.5ml/10kg | 4回 |
| ポララミンシロップ0.04% | 0.4mg/ml | | 1回1.2ml/10kg | 1-4回 |
| ペリアクチンシロップ0.04% | 0.4mg/ml | 1回2.4ml/10kg | 2～3歳　3ｍｌ/回<br>4～6歳　4ｍｌ/回<br>7～9歳　5ｍｌ/回<br>10～12歳　6.5ｍｌ/回 | 1-3回 |
| ザジテンシロップ0.02% | 0.2mg/ml | 3ml/10kg | 6ヶ月～2歳：4ml | 2回 |
| ザイザルシロップ0.05% | 0.5mg/ml | 5ml/10kg | 6ヶ月～11ヶ月：2.5ml<br>1～6歳：2.5ml<br>7～14歳：5ml<br>小児1回5ml | 1歳未満（1回）<br>1～14歳（2回） |
| ニポラジンシロップ0.03% | | 4ml/10kg | | 2回 |
| アタラックスPシロップ0.5% | 5mg/ml | 3.6～7.2ml/10kg | | 3-4回 |
| リンデロンシロップ0.01% | 0.1mg/ml | 1.2～19.2ml/10kg | | 1-4回 |
| デカドロンエリキシル0.01% | 0.1mg/ml | 1.2～19.2ml/10kg | | 1-4回 |
| アストミンシロップ0.25% | 2.5mg/ml | 約3～4.5ml/10kg | | 3回 |
| ムコダインシロップ5% | 50mg/ml | 6ml/10kg | | 3回 |
| ムコソルバンシロップ0.3% | 3mg/ml | 3ml/10kg | | 3回 |
| メジコン配合シロップ | 2.5mg/ml | 約3ml/10kg | | 3-4回 |
| フスコデ配合シロップ | | 2.4ml/10kg | | 3回 |
| メプチンシロップ | 5μg/ml | | 1回2.5ml/10kg（6歳未満）<br>1回5ml（6歳以上） | 3回（6歳未満）<br>1-2回（6歳以上） |
| アスベリンシロップ0.5% | 5mg/ml | 2.88～5.76ml/10kg<br>1歳未満　1～4ｍｌ<br>1～3歳未満　2～5ｍｌ<br>3～6歳未満　3～8ｍｌ | | 3回 |
| テオドールシロップ2% | 20mg/ml | 4.8ml/10kg | | 2回 |
| ペネトリンシロップ0.04% | 0.4mg/ml | 7.5ml/10kg | | 3回 |
| プリンペランシロップ0.1% | 1mg/ml | 5～7ml/10kg | | 2-3回 |
| カロナールシロップ2% | 20mg/ml | 10ml/10kg | | 4-6h空けて |
| トランサミンシロップ5% | 50mg/ml | 6ml/10kg | | 3-4回 |
| ポンタールシロップ3.25% | 32.5mg/ml | 1回2ml/10kg | | 2回 |
| ケイツーシロップ0.2% | 2mg/ml | 1.2ml/10kg | | 1回 |
| セルシンシロップ0.1% | 1mg/ml | 1～5ml（3歳以下）<br>2～10ml（4～12歳） | | 1-3回 |
| デパケンシロップ5% | 50mg/ml | 1.92～5.76ml/10kg | | 2-3回 |